



Moj otrok ima BRONHIOLITIS

Kaj je bronhioleitis?

Bronhioleitis je okužba spodnjih dihal, ki prizadene majhne, razvejane dihalne poti imenovane bronhiole. Preko bronhiole se zrak prenaša v in iz pljuč. Ob okužbi dihalne poti otečejo in so polne sluzi. Zato otrok težko diha.

Bronhioleitis običajno prizadene otroke, mlajše od 2 let. Pri večini otrok se bronhioleitis pozdravi sam po sebi, pri nekaterih otrocih je potreben pregled pri pediatru, nekateri otroci pa morajo biti zaradi potrebe po dodatku kisika v vdihanem zraku biti sprejeti v bolnišnico. Za težji potek bolezni so ogroženi predvsem otroci mlajši od 6 mesecev.

Bronhioleitis povzročajo virusi med katerimi je najpogostejši respiratorni sincicijski virus ali RSV. Virusi se običajno prenesejo s strajših sorojencev ali pa drugih članov družine, ki imajo izražene le prehladne znake. Največ obolelih je v jesenskih in zimskih mesecih lahko pa se okužba pojavi v kateremkoli letnem času.

Kakšni so simptomi bronhioleitisa?

Okužba se običajno začne s prehladnimi znaki. Otrok ima:

- zamašen nos ali izcedek iz nosu,
- kašlja,
- ima povišano telesno temperaturo (temperatura višja od 38 °C)
- in zmanjšan apetit.

Ko bronhioleitis napreduje, se lahko pojavi še:

- hitro ali oteženo dihanje, ki se kaže s povišano frekvenco dihanja v spanju, ugrezanjem medrebrnih prostorov lahko stokanjem,
- pri dojenčkih se lahko pojavijo premori v dihanju, ki trajajo več kot 15 ali 20 sekund,
- piski in poki nad pljuči, ki jih sliši zdravnik s stetoskopom,
- zaradi težkega dihanja otroci prenehajo piti in se hraniti,
- dojenčki se med dojenjem ali hranjenjem po steklenički lahko zelo utrujajo.



Ob teh znakih napredovale bolezni morate z otrokom nujno obiskati izbranega ali dežurnega pediatra!

Kako se bronhioleitis zdravi?

Zdravljenje bronhioleitisa je simptomatsko. Najpomembnejši so postopki s katerimi vaš otrok dobi dovolj kisika. Da bi to dosegli otroku, kadar je to potrebno, dodajamo kisik v vdihanem zraku, lahko pa uporabimo tudi zdravila za odpiranje dihalnih poti – bronhodilatatorje.

Otroka običajno ne zdravimo z antibiotiki, ker bronhioleitis povzročajo virusi in antibiotiki ne delujejo na viruse.

Ali lahko kaj storim, da bi se moj otrok počutil bolje?

Da. Lahko:

- poskrbite, da vaš otrok dobi dovolj tekočine,
- pri otroku znižujete povišano telesno temperaturo kadar je ta nad 38,5°C, (nikoli ne dajajte Aspirina otroku mlajšemu od 18 let!),
- skrbite za dobro prehodnost otrokovega noska z redno toaleta nosu s fiziološko raztopino večkrat na dan,
- se z otrokom izogibajte možnim novim okužbam dihal – z majhnim otrokom ne hodite v nakupovalne centre, se ne zadržujte v prostorih kjer je veliko ljudi,
- z otrokom se izogibajte cigaretnemu dimu.

Kako je moj otrok dobil bronhioleitis?

Bronhioleitis povzročajo virusi, ki se lahko širijo od osebe do osebe. Ti virusi živijo v kapljicah, ki gredo v zrak, ko bolnik kašlja ali kiha.

Ali je mogoče bronhioleitis preprečiti?

Možnost, da vaš otrok dobi bronhioleitis lahko zmanjšate z naslednjimi ukrepi:

- skrbite za dobro higieno rok in kašlja – vaše in otrokove roke pogosto umivajte z milom in vodo, uporabljate lahko tudi razkužila za roke,
- izogibajte se prostorov v katerih je veliko ljudi,
- prehlajene osebe prosite naj otroka ne obiskujejo dokler se popolnoma ne pozdravijo,
- izogibajte se cigaretnemu dimu,
- v času pogostih okužb dihal naj, v kolikor je to mogoče, starejši sorojenci ne obiskujejo vrtca.